

MANEJO

1-) Avicultura Caipira é criar uma ave de boa linhagem ou raça no SISTEMA CAIPIRA, com galpão e pasto cercado para ciscarem.

2-) Aves a serem adquiridas: Caipirão (Label-Rouge), Iza Brown, Embrapa 51, Rhodes, Carijó (Playmont Rock Barrado), New Hampshire, Gigante Negra..

3-) Adquirir animais com idade acima de 21 dias. Utilizar 5 aves por m² de galpão.

4-) Colocar uma fonte de calor dentro do galpão para aquecer as aves (alternativa: uma bacia emborcada para baixo com uma lâmpada de 100 W dentro, sendo pendurada para as aves ficarem embaixo – até 60 pintos).

5-) Forrar o chão com maravalha, capim seco ou sabugo de milho. As aves não devem ficar em contato direto com o chão.

6-) Colocar cochos e bebedouros.

7-) Utilizar somente comedouros automáticos com bordas viradas para dentro para evitar desperdício de ração.



s

SIM

NÃO

8-) Na chegada dos pintos colocar em cada Bebedouro de 2 litros colocar: 1 colher de açúcar, um polivitamínico (Ex: Vita-Gold Avícola – 2 ml/litro de água) e um coccidiostático (Ex: Vetococ – 1 envelope em 2 litros de água). Administrar essa solução por 3 dias trocando a água e produto a cada dia (são preventivos).

9-) Vacinar os animais contra Boubá (Pipoca) Aviária após esses 3 dias. Pegar 4 agulhas e prende-las com um durex. Molhar as agulhas na vacina e arranhar a ave ou na membrana da asa ou no lado interno das coxas (é uma vacinação igual a Variola).

10-) Vacinar contra New Castle. Colocar duas gotas da vacina nos olhos ou narinas de cada ave. Deve ser realizada uma semana após a vacinação da Boubá.



NEW CASTLE


BOUBA

11-) Após a 1ª vacinação na propriedade, vacinar contra a Boubá novamente 60 dias como reforço não precisando mais repetir a vacinação.

12-) Após a 1ª vacinação na propriedade, vacinar contra New Castle de 4 em 4 meses porém colocando a vacina na água que não deverá ter cloro.


13-) Não misturar lotes nos galpões e nos pastos. Cada lote que chegar deve ser criado em separado.

14-) Encher os cochos de 3 em 3 dias fechando-os por cima. Ir subindo os cochos para que fiquem na altura da barriga da galinha evitando que ela cisque e tire a ração de dentro dele, desperdiçando-a.



15-) Trocar a água diariamente que deve sempre estar fresca. Nenhum animal gosta de água quente e ela serve justamente para refrescar as aves.

16-) É indispensável a utilização das cortinas. Em dias de chuva, vento e frio baixá-las para manter os animais confortáveis. Galinhas detestam vento e umidade.



CORTINAS

17-) Colocar os ninhos quando as aves completarem 5 meses. 1 ninho para cada 5 aves.



NINHOS


18-) Todos os dias forneça alimentação alternativa para as aves de modo que elas coloquem ovos com gemas avermelhadas, característica das caipiras e diminua o consumo de ração (folhas de aipim, guando, leucena, frutas e legumes fora do padrão, caule de bananeira cortado, cana etc...).

ELABORAÇÃO DO FOLDER

**José Henrique Carvalho Moraes –
Médico-Veterinário da EMATER
Gerente de Pequenos e Médios Animais**



MANEJO DE AVES NO SISTEMA CAIPIRA



PROGRAMA



